



1. Acil ve zorunlu olmayan dental uygulamalar yapılmayarak ileri bir tarihe ertelenmelidir.
2. Acil olan ve işlem yapılacak hastalar ve beraberindeki kişilerden seyahat öyküsü sorgulanmalı ve ateş ölçümü yapılmalıdır.
3. Rubber dam ve yüksek emiş gücüne sahip tükürük emiciler (gerekirse çift emici), dental tedavilerde aerosol ve sıçramaları en aza indirmeye yardımcı olur.
4. Ayrıca, su ve hava spreyi kullanımı ve havalı tirübünlerin kullanımı ile oluşan aerosollerden korunmak için tüm yüz maskesi ve gözlük kullanımı gereklidir.
5. Her işlem sonrasında ve hasta odadan ayrıldıktan sonra çevre temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
6. Dental tetkik için en sık kullanılan radyograflardan ağız içi olanlar tükürük artışına ve öksürüğün tetiklenmesine yol açtığı için, COVID-19 salgını durumunda panoramik radyografi veya BT tercih edilmesi gereken alternatif yöntemlerdir.
7. Dental prosedürler esnasında çok sayıda damlacık ve partikül üretilebilir. Bu nedenle günlük klinik çalışmalarda standart koruyucu önlemler COVID-19'un yayılmasını önlemede yetersiz kalabilir.
8. Dental işlemlerin uygulandığı alanlarda kullanılması gereken KKE listesi: tek kullanımlık önlük, N95 maske, gözlük/yüz maskesi ve eldiven
9. Dental işlem sırasında cilt ve mukozayı korumak için önlük, maske, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. İşlem sırasında partikül oluştuğu için N95/FFP2 maskeler kullanılmalıdır.
10. El hijyenine uyulmalıdır.
11. İşlemler öncesinde antimikrobiyal gargara (% 1 lik Hidrojen Peroksit) kullanılması oral kavitedeki virusların sayısının azalmasına olanak sağlar.
12. Çapraz enfeksiyonların önlenmesi için tedavi odasının dışında gerçekleştirilen ve dışarıdan hizmet alınan laboratuvar uygulamaları için hizmet alan ve hizmet veren tarafları koruyacak özel önlemler önerilmelidir.
13. Tedavi için başvuran hastalardan COVID-19 şüphesi (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) olduğu düşünülenlerin, hastaya tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
14. COVID-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem

öncesi değerlendirmeleri hastayı takip eden hekimi ile birlikte yapılmalı ve alınacak tedbirlere birlikte karar verilmelidir.

15. Sosyal izolasyon kurallarının hasta bekleme ve tedavi alanlarında uygulanması için gerekli tedbirler alınmalıdır (hastaların randevularına saatinde gelmesi sağlanarak bekleme alanlarında bekletilmemesi, beklemesi gerekli durumlarda hastaların en az 1 metre mesafe ile oturtulması, bekleme alanlarındaki dergi, gazete vb kaldırılması).

| <b>Diş Klinikleri</b>         |  |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|
| <b>Bekleme/dinlenme odası</b> | Sağlık personeli                         | Hastayla doğrudan temas içermeyen ön değerlendirme            | Hastayla en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır.<br>KKE gerekli değildir.<br>(1 metre mesafe korunamayacaksa tıbbi maske takılabilir)   |
|                               | Solunum yolu semptomları olan hastalar   | Her durumda   | Hastayla en az 1 metre mesafe sağlanmalıdır.<br>Hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır.<br>Acil olmayan işlemler ertelenmelidir |
| <b>İşlem odası</b>            | Sağlık personeli ve odada bulunan herkes | Dental işlem yapılırken (Aerosol/partikül oluşturan işlemler) | N95 ya da FFP2 ya da eşdeğeri maske<br>Eldiven<br>Gözlük/Yüz koruyucu<br>Önlük<br>Bone  |